

令和6年度版

予防接種を 受けましょう



↑電子版はこちら



名古屋市

目次

予防接種とは	1
定期予防接種と任意予防接種	2
ワクチンとは	3
予防接種の副反応	4
副反応による健康被害の救済制度	5
予防接種を受けましょう	6
ロタウイルス	10
B型肝炎	11
五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)	12
小児肺炎球菌	14
BCG	15
麻しん・風しん	16
水痘(みずぼうそう)	17
日本脳炎	18
子宮頸がん	19
おたふくかぜ	21
おしえて予防接種!～こんなときどうする?～	22
スケジュール	24
接種間隔の考え方	26
ちょっと待った!その予防接種大丈夫?!	27
チェックリスト	28

予防接種とは

私たちの周りには様々な細菌やウイルスが存在していて、それぞれに対する抵抗力(免疫)がないと、病気になってしまいます。

生まれたばかりのお子さまは、お母さんから免疫を分けてもらっています。しかし、分けてもらった免疫は時間の経過とともに失われていくため、お子さま自身で免疫をつくって病気を予防する必要がでてきます。その助けとなるのが予防接種です。

赤ちゃんは免疫をつくる力が未熟なため、同じ病気でも大人がかかった場合より重症になりやすいことが多く、また、発育とともに外出の機会が多くなると、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種を正しく理解し、お子さまの健康にお役立てください。



定期予防接種と任意予防接種

予防接種には法律で市町村が接種を行うことが定められている定期予防接種と、それ以外の任意予防接種があります。また、名古屋市では、一部の任意予防接種について、助成制度を設けています。定期予防接種や名古屋市が実施する任意予防接種は、予防接種ごとに対象となる年齢、接種回数、接種間隔等が定められているため、注意してください。

子どもの定期予防接種

ロタウイルス、B型肝炎、五種混合(DPT-IPV-Hib)、小児肺炎球菌、BCG、麻しん・風しん、水痘、日本脳炎、二種混合(DT)、子宮頸がん

子どもの任意予防接種

●名古屋市が半額助成しているもの(自己負担金有)

おたふくかぜ

※生活保護世帯、市民税非課税世帯の方は自己負担金が免除されます。事前に申請が必要ですので、詳しくは保健センターへお問い合わせください。



●その他のもの

高齢者以外のインフルエンザ、狂犬病、A型肝炎など




ワクチンとは

予防接種に使用する薬液を「ワクチン」といいます。ワクチンには大きく分けて「生ワクチン」と「不活化ワクチン」があり、性質に違いがあります。


生ワクチン

病気の原因となるウイルスや細菌について、感染しても症状がほとんどでないくらい毒性が弱い性質にしたものを作り、そのまま接種して、感染させることで免疫をつくるワクチンです。
(ロタウイルス、BCG、麻しん・風しん、水痘、おたふくかぜなど)



不活化ワクチン

病気の原因となるウイルスや細菌を処理するなどして、免疫が反応するために必要な成分だけを精製して接種するワクチンです。十分な免疫を得るために複数回の接種が必要なものが多いです。
(B型肝炎、五種混合(DPT-IPV-Hib)、小児肺炎球菌、日本脳炎、二種混合(DT)、子宮頸がんなど)



予防接種の副反応

現在のワクチンは、できるだけ副反応が起きないように安全性を重視して開発されていますが、完全に副反応の無いワクチンはありません。

生ワクチンの主な副反応

生きたウイルスや細菌を感染させて免疫を作るため、本来その病気にかかった場合と同じ症状が出ることがあります。(通常、自然感染した場合に比べて極めて軽い症状です。)

不活化ワクチンの主な副反応

免疫をつけるために必要な成分を接種するのですが、免疫が反応することによって、発熱や接種部位の腫れなどがしばしば起こります。通常は一過性のものですので、症状が酷くなければ特に治療の必要はありません。極めて稀ですが、重篤な副反応では、脳炎、脳症などがあります。このような症状も免疫の過剰な反応が原因と考えられており、予防接種に限らず、風邪をひくなど、免疫を刺激するきっかけの後に起こることがあります。

予防接種と聞くと副反応を心配して、消極的になってしまう方もいらっしゃいますが、予防接種を受けないことで病気にかかるリスクは、副反応のリスクよりもずっと大きなものです。予防接種で病気の流行が抑えられていると、予防接種の効果を実感しにくいのですが、予防接種のおかげで流行していないのであり、昔は様々な病気で多くの方が亡くなっていたのです。

副反応による健康被害の救済制度

予防接種によって重篤な副反応が起こることは極めて稀ですが、完全にゼロにすることはできません。万が一、予防接種の副反応によって健康被害が生じた場合は、予防接種と症状との因果関係について、国の審議会で認定を受けたうえで、医療費、医療手当のほか、障害年金や死亡一時金などが給付される救済制度が設けられています。なお、脳症などは風邪などの後に起こることもあり、予防接種によって起きたことを厳密に証明することは困難なケースもあります。

定期予防接種と任意予防接種では救済制度が異なり、障害年金や死亡一時金は任意予防接種の方が金額が少なくなっていますが、名古屋市の実施する任意予防接種については、市が加入する保険により定期予防接種と同程度の給付があります。(完全に同じではありません。)

万が一、予防接種の副反応により健康被害が生じた場合は、お住まいの区の保健センターにご相談ください。



予防接種を受けましょう

①予防接種の計画を立てましょう。

予防接種にはたくさんの種類がありますが、接種できる年齢や接種の間隔は、予防接種の種類によって決められています。

あるワクチンを接種した場合、次に他のワクチンを接種できるまでの間隔は、ワクチンの種類によって異なります。

生ワクチン → 4週(27日)以上あける → 生ワクチン
(ロタウイルスを除く)

他の組み合わせは接種間隔の制限がありません(新型コロナワクチンを除く)

また、不活化ワクチンは複数回の接種を必要とするものが多いですが、1回目と2回目は○週以上の間隔を空けなければいけないといった決まりがワクチンごとにあります。

特に生後6か月くらいまでの時期は、短期間にたくさんの予防接種を受ける必要があるので、あらかじめスケジュールを立てて、計画的に接種を受けてください。

同時接種について

同時に複数のワクチンを接種する同時接種は、接種医師が必要と判断すれば、保護者の同意を得て行うことができます。早い時期に予防接種を済ませて免疫をつけることが可能なことや、保護者の負担軽減などのメリットがあり、最近は同時接種を行う医療機関が増えています。一般的には、同時接種を行っても効果や副反応には影響ないといわれています。

②医療機関に予約をしましょう

名古屋市の予防接種は、市内の指定医療機関(※)で受けることができます。まずは、かかりつけ医等が指定医療機関かどうかご確認ください。接種できる医療機関がわからない場合は、保健センターまたは名古屋市予防接種電話相談窓口にお問い合わせいただくな、名古屋市のホームページをご覧ください。通常、事前に予約が必要になりますので、必ず予約をしてからお出かけください。

(※)諸事情により、市外の医療機関での接種を希望される場合は、事前に申請が必要ですので、詳しくはお住まいの区の保健センターへお問い合わせください。

名古屋市内の指定医療機関



③当日のチェックポイント

① 予防接種は体調の良いときに受けることが原則です。当日はお子さまの状態をよく観察し、ふだんと変わったところがないか注意してください。お子さまの健康状態に気にかかるがあれば、医師に相談してください。



予防接種を受けましょう

② 予防接種を受けるには、以下のものが必要です。お忘れのないようにお持ちください。

母子健康手帳	接種の記録をしたり、これまでの接種状況を確認するために必要です。
シール式接種券	予防接種を受けるための接種券です。
子ども医療証や マイナンバーカードなど お子さまの住所がわかるもの	本人確認のためにお持ちください。

③ 接種の際に必要となる予診票及び説明書は、予約時などに医療機関でお受け取りください。

説明書をよくお読みいただき、予防接種の効果、副反応等についてご理解いただいたうえで接種を受けてください。

④ 予診票を接種当日にご記入ください。予診票は、接種する医師にとって大切な情報です。なるべく詳しく、正確に記入するようにしてください。持病、アレルギー、服用中の薬などがある方は、必ず医師に伝えてください。

⑤ 予防接種には原則、保護者の同伴が必要です。日頃の健康状態をよく知っている保護者の方が付き添ってください。



ここからは 子どもの定期予防接種 を紹介します

定期予防接種は、予防接種法という法律に基づいて、市町村が実施しているものです。法令によって実施する予防接種の種類と、対象となる年齢や接種回数等が定められています。名古屋市では、対象となる方は、市内の指定医療機関において無料で接種受けることができます。

病気の流行を抑えるために、対象の方は接種を受ける努力義務があり、原則として、全ての方に受けていただく予防接種です。



口タウイルス

生
ワクチン

どんな病気を予防するの？

口タウイルスは、乳幼児期に多く起こる感染性胃腸炎の原因となるウイルスの1つです。1回の感染では免疫が完全にできず、何回も感染を繰り返すことがあります、だんだん症状が軽くなっていきます。ほとんどの方が5歳までに一度は感染するといわれています。

嘔吐、水のような下痢を繰り返すのが特徴的な症状で、発熱を伴うことも多くみられます。通常は1週間程度で治りますが、重症になると、嘔吐と下痢によって水分が失われ、脱水症状で入院が必要になったり、まれに急性脳炎・脳症などの合併症が起こることがあります。初めての感染は重症になりやすいので、早めに接種を完了しましょう。

口タウイルスワクチンは、口から飲むワクチンで、かかるても症状を軽く済ませる効果があります。ワクチンは2種類あり、有効性、安全性に差はありませんが、接種回数等が異なります。どちらか一方のみを選択して接種します。




	2回接種ワクチン	3回接種ワクチン
対象年齢	出生6週0日後～24週0日後	出生6週0日後～32週0日後
接種回数	2回接種	3回接種
接種間隔	4週以上の間隔	

※いずれのワクチンも、1回目の接種は出生14週6日後までに接種しましょう。

B型肝炎

不活化
ワクチン



どんな病気を予防するの？

B型肝炎ウイルスの感染によっておきる肝臓の病気です。B型肝炎ウイルスは、出産時の母子感染、性的接触、注射器の回し打ちなど、主に血液や体液を通じて感染します。また、頻度は低いものの、家族間や保育園などで唾液や汗を通じて感染することがあるともいわれています。

子どもは免疫が未熟なため感染するとウイルスを排除できないことがあります。0歳児で感染した場合は、ほとんどの方が将来に渡って持続的に感染してしまいます。また、最近では大人が感染しても持続的な感染になりやすい、欧米型のウイルスが増えていることも問題となっています。持続的に感染した方の一部は将来、慢性肝炎に進行し、さらにそのうちの一部は肝硬変や肝がんへ進行してしまいます。

対象年齢	0歳
接種回数	3回接種
接種間隔	4週以上の間隔で2回接種し、1回目から20～24週の間隔(最低20週以上)で3回目を接種。 ※2回目と3回目の間隔が短すぎる場合、十分な効果が得られない可能性があります。

五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)

不活化
ワクチン

どんな病気を予防するの？

ジフテリア

ジフテリア菌の飛沫感染で起こる病気です。

感染すると、喉の腫れによる窒息や、菌の出す毒素による心筋炎や神経麻痺が原因で、5～10%程度の方が亡くなります。

百日せき

百日せき菌の飛沫感染で起こる病気です。

乳幼児がかからると重症化しやすく、激しい咳による呼吸困難や、脳炎や肺炎を併発して亡くなることもあります。生後2か月から可能な予防接種で、できるだけ早く受けることが望ましいです。

また、最近では予防接種の効果が無くなった大人が百日せきにかかることが増えており、子どもに感染させる原因にもなっています。長期間続く咳は、百日せきや結核の可能性がありますので、医師の診察を受けてください。

破傷風

土の中に潜んでいる破傷風菌が、傷口から感染して起こります。自分でわからぬくらいの軽い擦り傷から感染することもあります。菌の出す毒素により神経の麻痺症状が起これ、重症の場合は呼吸筋が麻痺して亡くなることもあります。



ポリオ

ポリオウイルスの感染により、神経が冒され、手足に麻痺が残ったり、呼吸筋の麻痺で死亡することもある病気です。感染しても症状が出なかったり、風邪程度の症状で済む場合がほとんどで、麻痺になる割合は数百人～千人に1人程度といわれています。

日本を含む多くの先進国では根絶されていますが、まだ一部の国々ではポリオの流行が続いています。免疫を持っていないとウイルスが持ち込まれた場合に感染が広がってしまうため、予防接種を行う必要があります。

ヒブ

ヒブは正式にはインフルエンザ菌b型という名前の細菌です。冬に流行するインフルエンザとは関係ありません。ヒブは、比較的多くの子どもの鼻やのどに住み着いていますが、そのままでは症状はありません。

しかし、まれに体内に侵入し、脳を覆う髄膜を侵す細菌性髄膜炎の他、敗血症、中耳炎といった様々な病気の原因となります。

対象年齢	1期：生後2か月～90か月末満／2期：11歳～13歳未満	
	※2期はDT(ジフテリア・破傷風)ワクチンで接種します。	
接種回数 と間隔	<p>初回接種</p> <p>3週以上の間隔で3回</p> <p>追加接種</p> <p>初回接種終了から6～18か月後 (最低6か月以上後)に1回</p> <p>※接種に用いるワクチンの種類によって 追加接種の標準接種期間が異なります。</p>	<p>1期</p> <p>2期</p> <p>1回接種</p>

小児肺炎球菌

不活化
ワクチン

どんな病気を予防するの？

肺炎は様々な原因で起こりますが、肺炎球菌は、肺炎の原因としてもっとも多い細菌です。比較的多くの子どもの鼻やのどに住み着いていますが、そのままで症状はありません。

しかし、まれに体内に侵入し、脳を覆う髄膜を侵す細菌性髄膜炎の他、敗血症、中耳炎といった様々な病気の原因となります。細菌性髄膜炎は亡くなったり、後遺症が残ることの多い病気で、免疫の未熟な乳児がかかることが多いため、生後2か月以降できるだけ早い時期に接種を開始して、免疫をつけておくことが望されます。



対象年齢	生後2か月～5歳未満	
接種回数と間隔	初回接種	4週以上の間隔で3回
	追加接種	初回接種終了から60日以上後かつ1歳の誕生日以降に1回

※接種回数と間隔は、生後2か月～7か月未満で開始したときのものです。開始月齢が遅れた場合、必要な接種回数が少なくなります。詳しくは母子健康手帳をお読みください。

どんな病気を予防するの？

BCGは結核の予防接種です。一般に結核というと、肺に結核菌が感染することで起こる肺結核が知られていますが、乳幼児が結核菌に感染すると粟粒結核や結核性髄膜炎という、全身や脳が冒される重篤な症状になることがあります。BCGはこのような病気の予防に高い効果があります。



海外ではBCGを行っていない国も多いですが、日本は現在も結核菌がまん延し、乳幼児の感染リスクが高いことから、実施されています。

対象年齢	0歳
接種回数	1回接種

接種後のご注意

接種してから2～4週間後に、接種部位が赤くなったり、膿が出たりしますが、免疫が正しくついている証拠ですので、包帯や絆創膏はせずに、清潔に保ってください。やがて、かさぶたになって治ります。3か月以上続くときは、医師の診察を受けてください。

また、このような症状が接種後10日以内（多くは3日以内）に出現した場合（コッホ現象）は、すでに結核に感染している可能性がありますので、接種した医師の診察を受けてください。

麻しん・風しん

生
ワクチン

どんな病気を予防するの？

麻しん（はしか）は発熱や発しんを主な症状とする病気で、風邪とは異なり肺炎や脳炎を合併して重症化することがあり、現在でも、かかった場合には500～1,000人に1人が亡くなるといわれています。

風しんは三日ばしかとも呼ばれ、はしかより症状は軽いことが多いのですが、妊娠初期に感染した場合は、赤ちゃんに影響が出る可能性が高いことから問題となっている病気です。免疫を持っていない成人男性が多いため、小規模な流行を繰り返しており、赤ちゃんに影響の出る事例が発生しています。

麻しんや風しんは感染力がとても強く、かかると有効な治療薬が無いため、予防接種で予防することが重要です。1回の接種では効果が不十分なことがあるため、1期、2期で2回接種を行う制度となっています。




対象年齢	1期：1歳／2期：小学校入学前年度（年長児相当）
接種回数	1期、2期それぞれ1回接種

水痘(みずぼうそう)



どんな病気を予防するの？

水痘ウイルスの感染によって、発熱とともに全身に発しんが出る病気です。軽い病気のイメージをお持ちの方も多いのですが、発しんが膿んで痕が残ったり、脳炎等を合併して重症化することもあり、年間20名前後が水痘で亡くなっています。感染力が強いため幼稚園や保育園で拡大しやすく、ワクチンの接種をしていないと、ほとんどの方が小学校入学までに自然感染してしまいます。感染の予防のためには、なるべく早く接種を受けてください。




対象年齢	1歳～3歳未満
接種回数	2回接種
接種間隔	6～12か月の間隔(最低3か月以上)

日本脳炎

不活化ワクチン

どんな病気を予防するの？

日本脳炎ウイルスは人から人へは感染しませんが、感染している豚を刺した蚊が、人間を刺すことによって感染します。感染しても多くの場合は症状が無かったり、風邪のような症状が出るだけですが、まれに脳炎を起こします。いったん脳炎を起こすと致死率は高く、回復しても半数程度の方に障害が残るといわれています。昔は国内で年間1,000人を超える患者が発生していましたが、現在は予防接種や生活環境の変化により、年間数名まで減少しています。発生地域は、西日本に多い傾向があります。



対象年齢	1期：生後6か月～90か月未満／2期：9歳～13歳未満	
接種回数 と間隔	1期	2期
初回接種	1週以上の間隔で2回	
追加接種	初回接種終了から約1年後 (最低6か月以上後)に1回	1回接種

※標準として、3歳で2回接種し、4歳で1回接種します。

子宮頸がん

不活化
ワクチン

どんな病気を予防するの？

子宮頸がんは、子宮の入り口にできるがんで、ヒトパピローマウイルスに感染することが主な原因となります。性交渉によって誰でも感染する機会のあるウイルスで、8割くらいの女性が一度は感染するといわれています。

感染しても自然に排除されることが多く、がんになるのは1%以下といわれていますが、年間約11,000人が発病し、約2,900人が亡くなっています。

ワクチンは、ウイルスの感染を防ぐことによって子宮頸がんを予防しますが、ウイルスの型によっては予防できない場合もあるので、大人になってからは、子宮がん検診を定期的に受けることも必要です。ワクチンは「サーバリックス」と「ガーダシル」と「シルガード9」の3つの製品があり、いずれか一つのみを選択して接種します。



対象者	小学校6年生～高校1年生相当年齢の女子
接種回数	2回または3回接種

標準的な接種間隔	サーバリックス	1回目 1か月後 → 2回目 5か月後 → 3回目
	ガーダシル	1回目 2か月後 → 2回目 4か月後 → 3回目
	シルガード9 (3回法)	1回目 2か月後 → 2回目 4か月後 → 3回目
	シルガード9 (2回法)	1回目 6か月後 → 2回目 (1回目が15歳未満のとき)

ここからは 子どもの任意予防接種 を紹介します

任意予防接種は、定期予防接種以外の予防接種で、通常は、希望される方だけが自費で任意に接種を受けます。

任意予防接種には狂犬病やA型肝炎等、国内ではほとんど流行のないものもありますが、国内で流行していて、予防接種の効果が高い病気もあり、名古屋市では、おたふくかぜの任意予防接種について費用助成を行っています。対象にあてはまる方は、市内の指定医療機関で自己負担金(通常の半額程度)を支払って接種を受けることができます。

なお、生活保護世帯または市民税非課税世帯に属する方は、自己負担金の免除制度があります。事前に申請が必要でするので、詳しくは保健センターへお問い合わせください。



おたふくかぜ



どんな病気を予防するの？

ムンプスウイルスの感染によって、耳の下、頬の後ろ側などが腫れたり、発熱などの症状が出る病気です。数十人に1人程度の割合で無菌性髄膜炎を起こして入院が必要となります。また、1,000人に1人くらいの頻度で難聴の後遺症が生じます。3人に1人の割合でかかっても症状が出ないことがあります、その場合でも難聴の後遺症が生じる可能性があります。



助成対象年齢	1歳～小学校入学前年度(年長児)
接種回数	1回接種
自己負担金	3,000円
その他の条件	過去におたふくかぜにかかったことや、日本でおたふくかぜの予防接種を受けたことがない方

接種後の注意

おたふくかぜは、予防接種を受けてもかかってしまうことが2～3割あるといわれます（ほとんどの場合症状は軽くなります）。予防接種の効果をより確実にするために、日本小児科学会等では2回の接種が推奨されていますが、2回目の接種は助成の対象となりませんのでご注意ください。

おしえて予防接種！～こんなとき どうする？～



新米パパママ
予防接種って、種類も回数もたくさんあって、よくわからないなあ。

まずは、「なごや予防接種ナビ」を使ってみたら？
予防接種のスケジュールがニックネームと生年月日だけで簡単に作れて、接種前にメールでお知らせしてくれるよ。



先輩パパ



新米パパママ
接種スケジュールを作ってみたけど、1回でこんなに何種類も接種していいの？！

「同時接種」といって、医師の判断で同時に複数のワクチンを接種することができて、医療機関に行く回数が少なくて済むよ。もちろん、1種類ずつ接種することもできるよ。



先輩ママ



新米パパママ
子どもが急に発熱！予定していた日に予防接種が受けられなかったけど、どうしよう…。

小さい子どもは、急に体調が悪くなったりして、予定通りにいかないことが多いよね。
そんなときは、「なごや予防接種ナビ」で簡単に接種スケジュールを作り直すことができるよ！



先輩パパ



新米パパママ
予防接種のために医療機関へ行くと、他の子の病気をもらってきそうで怖いな。

この時期に受ける予防接種は、接種を受けずに感染してしまうと重症化しやすい病気から守るものばかりで、とっても大切だよ。決められた期間内に受けるようにしよう。



先輩ママ



新米パパママ
ありがとう、これで予防接種に行けそうだわ。

それは良かった。
接種当日は、子どもの体調を確認するとともに、母子健康手帳・シール式接種券・子ども医療証やマイナンバーカードなどお子さまの住所がわかるものを忘れずに持って行ってね！



先輩パパ

この他にも、予防接種について気になることがあるときは、各区の保健センターや予防接種電話相談窓口にご相談ください！

電話番号はこの冊子の裏表紙をご覧ください。

名古屋市が実施する予防接種 スケジュール(乳幼児)

		2 か 月	3 か 月	6 か 月	9 か 月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	備 考
定期接種	ロタウイルス 2回接種ワクチン 3回接種ワクチン			↓ ↓								接種可能期間が短いので、他の予防接種のスケジュールも考えて、計画的に接種を受けてください。
	B型肝炎			↓ ↓ ↓ ↓								お母さんから赤ちゃんへの感染予防として、出産直後にB型肝炎ワクチンの接種を受けた方は対象となりません。
	ジフテリア・百日せき・破傷風・ 不活化ポリオ・ヒブ (DPT-IPV-Hib)第1期			↓ ↓ ↓		↓						生後2か月になったら、できるだけ早く開始しましょう。ヒブ又は四種混合ワクチンで接種を開始した方は同一ワクチンで接種完了してください。※令和6年4月開始
	小児肺炎球菌			↓ ↓ ↓		↓						生後2か月になったら、できるだけ早く開始しましょう。 追加接種は1歳を過ぎてから行ってください。
	BCG				↓							生後1歳までの接種により、小児の結核の発症や重い後遺症が残るリスクを減らすことができます。
	麻しん・風しん(MR) 第1期、第2期					↓ (1期)				↓ (2期)		1期は1歳になったら、2期は年長児相当の学年になったら、できるだけ早く接種しましょう。
	水痘 (みずぼうそう)					↓ ↓						1歳になったら、できるだけ早く接種しましょう。
	日本脳炎 第1期						↓ ↓ (初回接種) (追加接種)					原則として、3歳になってから接種を開始します。
接種任意	おたふくかぜ					↓						接種する場合は、1歳を過ぎた後できるだけ早めが望ましいです。遅くても、保育園等で集団生活を行う前までに接種を受けましょう。

■ 対象年齢

↓ 接種時期の目安(あくまでおおまかな目安です。必要な接種間隔を考慮して、スケジュールを決めてください。)

接種間隔の考え方



「4週以上の間隔をあけて」接種するって、
どういうこと？

例えば、1日(月)に1回目の予防接種を行い、4週以上の間隔をあけて2回目の予防接種をする場合、以下のようになります。

日	月	火	水	木	金	土
	1 (接種日)	2 (1日目)	3 (2日目)	4 (3日目)	5 (4日目)	6 (5日目)
7 (6日目)	8 (7日目)	9 (8日目)	10 (9日目)	11 (10日目)	12 (11日目)	13 (12日目)
14 (13日目)	15 (14日目)	16 (15日目)	17	18	19	20
21 (20日目)	22 (21日目)	23 (22日目)				
28 (27日目)	29 接種可能	30	31			

4週(27日)以上
の間隔をあけると
29日(月)から接種可能

注意 同じワクチンを接種する場合は、ワクチンごとに1回目と2回目を〇週以上あけないといけないといった決まりがあります。

こういった場合、接種した日の〇週間後の同じ曜日から次の接種ができます。

決められた間隔をあけて接種しないと、予防接種の正しい効果が期待できませんのでご注意ください。

各ワクチンのページで接種間隔の決まりを確認しましょう！

ちょっと待った！その予防接種大丈夫？！

～間違った予防接種をしないように気をつけましょう～

【間違いの例】

ケース1

小児肺炎球菌の接種を生後7か月で開始。接種回数は4回でいいよね？！



生後7か月で接種を開始した場合は3回接種だった！



解説

小児肺炎球菌は接種を開始した時期によって接種回数が変動します。生後7か月以上12か月末満で接種を開始した場合、初回接種2回+追加接種1回の計3回接種となります。詳しくは、母子健康手帳をお読みください。

ケース2

B型肝炎は不活化ワクチンだから接種間隔は気にしなくていいよね？！



B型肝炎は1回目と2回目の間隔が4週以上、1回目と3回目の間隔が20週以上必要だった！

解説

生ワクチン・不活化ワクチンで規定されている間隔は、他のワクチンを接種する場合です。同じワクチンを接種する場合は、ワクチンごとに必要な間隔が決まっています。予約の前に必ず前回の接種日を確認し、間隔が空いているか確かめましょう。

ケース3

接種年齢の期限が近づいてきたため慌てて接種！



忘れていたけど、実は以前に接種していたため、余分に接種してしまった！

解説

焦って接種すると、実は接種していたということがよくあります。予約前に落ち着いて必ず母子健康手帳を確認し、計画的に接種しましょう。

チェックリスト

予約

- 接種日時点で対象年齢ですか
- 母子健康手帳を確認しましたか
- 前回の接種から必要な間隔が空いていますか

前日～当日

- お子さまの体調は良好ですか
- 母子健康手帳は持ちましたか
- シール式接種券は持ちましたか
- 子ども医療証やマイナンバーカードなどお子さまの住所がわかるものは持ちましたか

接種後は…

お子さまの体調に変化がないか注意しましょう。また、母子健康手帳の接種記録を確認しましょう。



なごや 『予防接種ナビ』

予防接種スケジュールの作成や
医療機関検索ができます！



「なごや予防接種ナビ」は名古屋市の予防接種情報を提供するサービスです。

お子様に合わせた予防接種スケジュールを自動で作成し、接種日が近づくとメールでお知らせします。

登録は無料ですので、市民の皆様はぜひご活用ください。

医療機関検索のみのご利用でしたら、登録しなくてもご確認いただけます。



登録

生年月日、接種するワクチンなどを入力

予防接種のスケジュールを
自動で作成

接種の前にメールでおしらせ！

登録料・
利用料は
無料です

アプリダウンロードは
こちらから



スマートフォンや
パソコンからアクセス！

webサイト



なごや予防接種ナビ | Q. で検索

保健センター電話番号一覧

おかげ間違いにご注意ください

千種保健センター	753-1982
東保健センター	934-1218
北保健センター	917-6553
西保健センター	523-4618
中村保健センター	433-3093
中保健センター	265-2262
昭和保健センター	735-3962
瑞穂保健センター	837-3264
熱田保健センター	683-9682
中川保健センター	363-4461
港保健センター	651-6537
南保健センター	614-2814
守山保健センター	796-4624
緑保健センター	891-3623
名東保健センター	778-3114
天白保健センター	807-3912

名古屋市予防接種電話相談窓口 972-3969